

## 세프포독심 성분 제제 허가사항 변경(안)

### 3. 이상반응

1)~5) <생략>

6) 중추신경계 : 신기능 장애가 있을 때 용량 조절을 하지 않았을 경우, 인식장애, 행동장애, 경련 등이 나타날 수 있다. 시판 후 사용에서 발작이 보고되었다.

7)~12) <생략>

### 4. 일반적 주의

1)~4) <생략>

5) 세팔로스포린 제제 투여로 발작이 발생할 수 있으며, 특히 용량을 적절하게 감량하지 않은 신장애 환자에서 발생한다. 발작이 발생하면 투여를 중지하고 임상적으로 필요할 때만 항전간요법이 투여될 수 있다.

## 세프포독심 성분 제제 허가사항 변경

항목	기허가 사항	변경(안)
3. 이상반응	1)~5) <생략> 6) 중추신경계 : 신기능 장애가 있을 때 용량 조절을 하지 않았을 경우, 인식장애, 행동장애, 경련 등이 나타날 수 있다. <신설> 7)~12) <생략>	1)~5) <좌동> 6) 중추신경계 : 신기능 장애가 있을 때 용량 조절을 하지 않았을 경우, 인식장애, 행동장애, 경련 등이 나타날 수 있다. <u>시판 후 사용에서 발작이 보고되었다.</u> 7)~12) <좌동>
4. 일반적 주의	1)~4) <생략> <신설>	1)~4) <좌동> 5) <u>세팔로스포린 제제 투여로 발작이 발생할 수 있으며, 특히 용량을 적절하게 감량하지 않은 신장애 환자에서 발생 한다. 발작이 발생하면 투여를 중지하고 임상적으로 필요할 때만 항전간요법이 투여될 수 있다.</u>