

메틸프레드니솔론 함유 제제 허가사항 변경대비표

<주사제>

항목	기허가 사항	변경(안)
5. 일반 적 주의	1) ~14) <생략>	1) ~14) <생략>
	15) 기타 (1) ~ (3) <생략> (4) <신설>	15) 기타 (1) ~ (3) <생략> (4) <u>시판 후 사용 중 혈액암과 고형암을 포함한 악성종양 환자에서 전신 코르티코스테로이드 단독투여 또는 다른 화학요법제와의 병용투여 후 종양용해증후군(TLS)이 보고되었다. 이러한 종양용해증후군의 위험이 높은 환자는 종양의 증식률과 종양 부담(tumor burden)이 높고 세포독성 항암제에 높은 민감도를 가진 환자로서 주의깊게 모니터링하고 적절한 조치를 취해야 한다.</u>

<경구제>

항목	기허가 사항	변경(안)
4. 일반 적 주의	1) ~9) <생략> 10) <신설>	1) ~9) <생략> 10) <u>시판 후 사용 중 혈액암과 고형암을 포함한 악성종양 환자에서 전신 코르티코스테로이드 단독투여 또는 다른 화학요법제와의 병용투여 후 종양용해증후군(TLS)이 보고되었다. 이러한 종양용해증후군의 위험이 높은 환자는 종양의 증식률과 종양 부담(tumor burden)이 높고 세포독성 항암제에 높은 민감도를 가진 환자로서 주의깊게 모니터링하고 적절한 조치를 취해야 한다.</u>
	10) <생략>	11) <생략>