

## 암로디핀 함유 제제 허가사항 변경대비표

### <복합제>

#### ○ 암로디핀 · 올메사르탄

| 항목               | 기허가 사항                                                               | 변경(안)                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.<br>약물상호<br>작용 | 2) 암로디핀<br>①~④<생략><br>⑤ 암로디핀이 다른 약물들에 미치는 영향:<br><생략><br><br><이하 생략> | 2) 암로디핀<br>①~④<생략><br>⑤ 암로디핀이 다른 약물들에 미치는 영향:<br><생략><br><u>- 타크로리무스: 이 약과 병용투여 시 타크로리무스의 혈중농도 증가 위험이 있으므로 타크로리무스로 치료 받는 환자에게 이 약 투여 시 타크로리무스의 혈중농도를 모니터링하고, 타크로리무스의 투여량을 적절히 조절하여 타크로리무스 독성을 피하도록 해야 한다.</u><br><이하생략> |

#### ○ 암로디핀 · 발사르탄

| 항목         | 기허가 사항                                                                                                | 변경(안)                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.<br>상호작용 | 1) 발사르탄<br><생략><br>2) 암로디핀<br>①~⑤ <생략><br><u>&lt;신설&gt;</u><br>⑥ 추가적인 약물상호작용 정보는 암로디핀 단일제 허가사항을 참조한다. | 1) 발사르탄<br><생략><br>2) 암로디핀<br>①~⑤ <생략><br><u>⑥ 타크로리무스: 이 약과 병용투여 시 타크로리무스의 혈중농도 증가 위험이 있으므로 타크로리무스로 치료 받는 환자에게 이 약 투여 시 타크로리무스의 혈중농도를 모니터링하고, 타크로리무스의 투여량을 적절히 조절하여 타크로리무스 독성을 피하도록 해야 한다.</u> |