

이부프로펜 단일제(액상시럽제) 허가사항 변경대비표

	변경 전	변경 후															
용법·용량	<p>★ 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 연조직손상, 비관절 류마티스질환, 급성통풍, 건선성 관절염 : 성인 이부프로펜으로서 1회 200-600mg 1일 3-4회 경구투여한다. 1일 최고 3200mg까지 투여할 수 있다.</p> <p>★ 연소성 류마티양 관절염 : 1일 체중 kg당 30-40mg을 3-4회 분할 경구투여한다.</p> <p>★ 경증 및 중등도의 동통, 감기: 성인 1회 200-400mg 1일 3-4회 경구투여한다.</p> <p>★ 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.</p> <p>★ 어린이는 다음 1회 용량을 1일 3-4회 경구투여한다. <u>체중이 30kg미만인 어린이는 1일량이 500mg(25ml)을 초과해서는 안되며 공복시 투여는 피하는 것이 바람직하다.</u></p> <p><u>어린이 1회 용량 :</u> <u>11-14세 : 200-250mg (10-13ml)</u> <u>7-10세 : 150-200mg (8-10ml)</u> <u>3- 6세 : 100-150mg (5- 8ml)</u> <u>1- 2세 : 50-100mg (3- 5ml)</u></p>	<p>(좌동)</p> <p>★ 어린이는 다음 1회 용량을 1일 3-4회 경구투여한다. <u>공복시 투여는 피하는 것이 바람직하다.</u></p> <p><u>어린이 1회 용량 및 1일 최대 용량</u></p> <table><tr><th><u>연령</u></th><th><u>1회 용량</u></th><th><u>1일 최대용량</u></th></tr><tr><td><u>11~14세</u></td><td><u>200-250mg (10-12.5mL)</u></td><td><u>1000mg (50mL)</u></td></tr><tr><td><u>7~10세</u></td><td><u>150-200mg (7.5-10mL)</u></td><td><u>800mg (40mL)</u></td></tr><tr><td><u>3~6세</u></td><td><u>100-150mg (5-7.5mL)</u></td><td><u>600mg (30mL)</u></td></tr><tr><td><u>1~2세</u></td><td><u>50-100mg (2.5-5mL)</u></td><td><u>400mg (20mL)</u></td></tr></table>	<u>연령</u>	<u>1회 용량</u>	<u>1일 최대용량</u>	<u>11~14세</u>	<u>200-250mg (10-12.5mL)</u>	<u>1000mg (50mL)</u>	<u>7~10세</u>	<u>150-200mg (7.5-10mL)</u>	<u>800mg (40mL)</u>	<u>3~6세</u>	<u>100-150mg (5-7.5mL)</u>	<u>600mg (30mL)</u>	<u>1~2세</u>	<u>50-100mg (2.5-5mL)</u>	<u>400mg (20mL)</u>
	<u>연령</u>	<u>1회 용량</u>	<u>1일 최대용량</u>														
<u>11~14세</u>	<u>200-250mg (10-12.5mL)</u>	<u>1000mg (50mL)</u>															
<u>7~10세</u>	<u>150-200mg (7.5-10mL)</u>	<u>800mg (40mL)</u>															
<u>3~6세</u>	<u>100-150mg (5-7.5mL)</u>	<u>600mg (30mL)</u>															
<u>1~2세</u>	<u>50-100mg (2.5-5mL)</u>	<u>400mg (20mL)</u>															

끝.